

ZAKLJUČEK

Ob primerjavah morfoloških karakteristik: širin ram in širin bokov ljubljanskih šolarjev iz raziskave leta 1969/70 in študije prof. Škerlja izpred tridesetih let skušamo strniti glavne ugotovitve:

- širina ramen je tako pri dečkih kot deklicah parameter, kjer šolarji in šolarke izpred 30 let ne presežejo rasti naših raziskovancev;
- širina bokov pa je karakteristika, kjer prednjačijo raziskovanci prof. Škerlja;
- pri obeh morfoloških karakteristikah (biakromij in bitrohanter) je jasna tendenca k ustalitvi rasti pri naših raziskovancih: pri dekletih od 15. leta, pri fantih od 16. leta. Tega za preiskovance prof. Škerlja sploh ne moremo trditi, njegove preiskovanke pa to tendenco rahlo nakazujejo nekako od 17. leta dalje.
- 30-letni trend razvoja obeh širinskih mer trupnega skeleta pri fantih nakazuje tendenco oženja medenice današnje generacije ob enaki širini ramen. Primerjave tudi pri dekletih kažejo na to, da imajo naše preiskovanke pri 18. letih sicer statistično neznačilno širši biakromij od predvojne generacije, ob istočasnem ožjem bitrohantru, kar je statistično značilno.

Bitrohanterna retardacija ob spremenjeni medsebojni relaciji obeh širinskih mer trupa obeh spolov nakazuje tendenco izenačevanja širinskih proporcev trupa deklet s fanti.