

ZAKLJUČAK

1. Centralna vrijednost menarhe pulskih srednjoškolki je 13,49 godine, a dominantna je 13. godina. Kod njihovih majki je nastupila menarha prosječno sa 14,45 godina, pa je razlika značajna.

Raspon menarhe kćerki je od 10—16 godine, a kod majki 9—14 godine, vjerojatno uslovljen teškim ratnim prilikama u to doba.

2. »Bolnost« se javlja kao popratna pojava kod 49,4% učenica.

3. Porazni su pokazatelji da svega 38,0% učenica učestvuje u tim danima u nastavi tjelesnog odgoja, iako 28,0% tj. 140 uopće nema u doba menstruacije nikakve poteškoće.

4. Pojava menarhe, kao i subjektivne poteškoće u to doba ne razlikuju se kod sportašica i kod nespportašica. Činjenica da i sportašice apstiniraju od nastave tjelesnog odgoja ukazuje na to da se vjerojatno radi o »epidemiji ne-vježbanja« (»ne vježba kolegica, pa neću ni ja«).

5. Nismo našli nikakove pouzdane podatke o eventualnom utjecaju klime na pojavu menarhe.

6. Hipotezu da se menarha javlja ranije u djevojaka čiji roditelji imaju višu stručnu spremu — nije se mogla dokazati.