

*Tuberossitas interossea radii* je nestalna morfološka formacija koja se kod naših recentnih stanovnika nalazi u 68,33% slučajeva najčešće (u 98%) u vidu jedne izdužene vretenaste površine dugačke prosečno 1,78 cm, široke prosečno 0,29 cm., u nivou *margo interossea radii*. Gornji pol kvрге je udaljen od donjeg pola *tuberossitas radii* 2,51 cm. prosečno, a od sredine gornje unutrašnje ivice glavice žbice 7,63 cm.

U visini *tuberculum interosseum radii* na kostima na kojima je ova kvrga izražena, kao i u odgovarajućem nivou na kostima na kojima međukoštana kvrga ne postoji pripajaju se snopovi vezivnih vlakana međukoštane membrane podlakta i *ligamentum interosseum antebrachi*.

Kod majmuna i nekih sisara na odgovarajućem nivou međukoštane ivice žbice nalazi se dodirna površina sa međukoštanom ivicom lakatne kosti koja je ispupčena i neravna. *Tuberculum interosseum antebrachi* kod čoveka po svome obliku podseća na ovu neravninu kod majmuna.

*Tuberculum interosseum radii* se može shvatiti kao jedna rudimentarna formacija koja se nalazi na mestu nekadašnjeg intimnijeg kontakta ulnae i radiusa.