

# NEKE KOMPONENTI SOMATOTIPA U DUBOKOJ STAROSTI

V. Todorov, S. Maksimova

## REZIME

Istraživani su neke komponenti somatotipa kod 195 osoba čitavoj zemlji (78 muškaraca i 117 žena). Prosečni uzrast obuhvaćenih lica iznosi  $91,81 \pm 2,45$  godina kod muškaraca i  $91,38 \pm 8,79$  godina kod žena. Prprateni su sledeće obeležja: visina tela, telesna masa, indeks telesnoj mase (BMI), debljina kožnih nabora na tricepsa i subskapularno (u mm i sa korektivom). Posebno su istraživani kožni nabori od lica sa gojaznosti i sa normalnoj telesnoj mase. Kod žena oba nabora su približno jednake (oko 10 mm za čitavoj grupe), sa blizkim rezultatima i u podgrupama sa normalnoj telesnoj mase i sa gojaznosti. Kod muškaraca debljina subskapularnog kožnog nabora je signifikantno veću ( $9,12 \pm 3,29$  mm prema  $16,13 \pm 4,81$  mm,  $p < 0,001$ ). Slične su tendencije kod osoba sa i bez gojaznosti.

Pada u oči da ne postoju značajne razlike u odnosu telesnoj mase i uzrasta kod žena, dok kod muškaraca sa normalnoj telesnoj mase uočavamo veću prosečnu uzrast ( $p < 0,05$ ). U odnosu BMI konstatujemo pozitivnu korelaciju sa debljine kožnih nabora subskapularno i u oblasti tricepsa.