

ZAKLJUČAK

1. Ne postoji statistički značajna razlika prosečnih vrednosti u položaju gornjih inciziva prema prednjem delu kranijalne baze i osnovnoj ravni gornje vilice u međusobnom odnosu naših ispitanika sa malokluzijama I, II/1 i III klase.

2. Visoka signifikantnost razlika prosečnih vrednosti u položaju donjih inciziva naše ispitanike: donji incizivi dece sa malokluzijom I klase su u položaju normoinklinacije, II/1 klase u položaju anteinklinacije a III klase u položaju retroinklinacije.

3. Deca sa normokluzijom i distokluzijom II/1 klase imaju smanjen, a sa progenijom povećan. Postoji visoka signifikantnost razlika prosečnih vrednosti ugla između sve tri vrste nepravilnosti.

4. Visoka statistička značajnost razlika u položaju gornjih sekutića prema NPg liniji zajednička je karakteristika sve tri grupe naših pacijenata: kod dece sa normokluzijom oni su u položaju blage protruzije, dvostruko izrazitije protruzije kod dece sa distokluzijom II/1 klase, a u položaju retruzije kod dece sa progenijom.

5. Samo u položaju donjih sekutića prema NPg liniji između pacijenata sa distokluzijom II/1 klase i progenijom postoji visoka signifikantnost. Antepozicija donjih sekutića odlikuje pacijente sa distokluzijom II/1 klase.