

KRVNO–GRUPNA PRIPADNOST SISTEMIMA ABO I REZUS FAKTORA KOD ETNOSA JUGOZAPADNOG DELA BALKANSKOG POLUOSTRVA

Todorov V., S.Maksimova, A.Timčeva

Klinički centar endokrinologije i gerontologije, Medicinski fakultet, Sofija

REZIME

Istraživanja su obuhvatila 3029 osoba oba pola iz 5 etničkih grupa Jugozapadnog dela Balkanskog poluostrva u vezi njihove pripadnosti krvno–grupnim sistemima ABO i Rezus faktora. Autori su obuhvatili lica sledećih etnosa: Crnogorce, (1815), Cincare – Vlahe (501), Makedonce (343), Grke (412) i Albance (138). Analiza po grupama pomoću χ^2 kriterijuma pokazuje značajne razlike, kako u odnosu na distribuciju grupa prema sistemu ABO ($K=16$, $p<0,001$, $\chi^2= 41,6908$) tako i u odnosu na Rezus faktor ($K=4$, $p<0,001$, $\chi^2= 22,9656$). Podaci koje smo dobili pre svega su u vezi sa razlikama u frekvenciji 0 krvne grupe (koja preovladuje kod Grka i Albanaca) i manjeg relativnog udela Rh negativnog kod Cincara – Vlaha (6,39%) i Grka (9,71%).

Ključne reči: Etničke grupe, krvno–grupni sistemi