

# UČESTALOST RAĐANJA DECE SA KONGENITALNIM ANOMALIJAMA U PORODILIŠTU PROKUPLJE

Božinović D.<sup>1</sup>, Mladenović I.<sup>1</sup>, Božinović N.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Zdravstveni centar „ Toplica „ Prokuplje

<sup>2</sup> Vojno - Medicinski centar Niš

## ABSTRACT

Pod kongenitalnim anomalijama se podrazumevaju morfološke, strukturne i funkcionalne abnormalnosti organa, organskih sistema i tkiva, nastale tokom morfogeneze a prisutne i vidljive na rođenju.

Etiološki faktori koji dovode do nastanka kongenitalnih anomalija mogu biti: multifaktorijalni, monogenetski, hromozomski, teratogeni i nepoznati uzroci.

Cilj našeg rada je da utvrdimo kolika je učestalost dece sa kongenitalnim anomalijama rođenih u porodilištu Prokuplje od 1990. do 2004. god. Podatke smo uzeli iz protokola živorođene dece.

U posmatranom petnaestogodišnjem periodu od ukupno 16479 novorođene dece njih 659 ili 4% je imalo neku od kongenitalnih anomalija. Najveća učestalost anomalija je na stopalima i kukovima. Evidentna je i učestalost rađanja dece sa Sy Dawn.

Ovako posmatrano broj kongenitalnih anomalija uklapa se u procentualnu zastupljenost kako u zemlji tako i u inostranstvu. Ali zabrinjava da je u ovom periodu natalitet opao za četvrtinu a da je broj dece sa kongenitalnim anomalijama višestruko povećan.

Ključne reči: novorođenče, kongenitalne anomalije, genetska savetovališta.