

REZIME I ZAKLJUČAK

1. Izvršena je studija 17.115 novorođenčadi oba pola, rođenih na Klinici za akušerstvo i ginekologiju Kliničke bolnice u Novom Sadu u periodu od 1. I 1961. do 31. XII 1966. godine, sa težinom većom od 1000 grama.

2. Data je procentualna distribucija učestalosti pojedinih težinskih i visinskih skupina prema polu (9030 m. i 8085 ž).

3. Istaknuta je procentualna disocijacija učestalosti muške i ženske nedonoščadi u odnosu na težinu i dužinu. U odnosu na dužinu bilo je muške nedonoščadi 8,68%, a ženske 11,18% dok je u odnosu na težinu muške nedonoščadi nađeno 8,55 a ženske 11,18%.

4. Diskutovano je o biološkom pojmu nedonoščadi i istaknuto je da sadašnja definicija akušerske i pedijatrijske nedonoščadi je dovoljno tačna, proizvoljna i arbitrarna.

5. Diskutovano je o smanjenju kriterijuma za pedijatrijsko nedonošče i predloženo je da gornja granica bude 2.000 grama (verovatnije 1800 za žensku i 2.200 gr. za mušku nedonoščad).

6. I dalje se predlaže da težina bude merilo, jer je merenje dužine podložno brojnim varijacijama i uticajima.

7. Istaknuta je potreba dalje brižljive studije ovog prevashodno biološkog pojma, radi pronalaženja preciznijih bioloških merila za određivanje suštinskog pojma nedonoščeta.